

Workshop:

QUẢN LÝ MÔ MỀM QUANH IMPLANT



Phiên dịch viên
BS. Nguyễn Minh Quân



26/07/2026

- 09:00 - 12:00
- 14:00 - 17:00



Khách sạn Tân Sơn Nhất

200-202 Hoàng Văn Thụ, P. Đức Nhuận, TP.HCM

DR.
MARTINA
STEFANINI

PROFILE

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ – Khoa học Y sinh và Thần kinh vận động, Đại học Bologna (Ý).
- Giám đốc Trường Chăm sóc Nha khoa, Đại học Bologna.
- Giảng viên chương trình Thạc sĩ Quốc tế cấp độ II.
- Cựu Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học San Raffaele Milan.
- Cộng sự lâu năm của Giáo sư Giovanni Zucchelli.
- Thành viên Ban điều hành ITI Section Ý (nhiệm kỳ 2023–2025).
- Chủ tịch Câu lạc bộ nghiên cứu ITI.
- ITI Fellow; Thành viên Ủy ban Phát triển Lãnh đạo ITI toàn cầu (2018–2025).
- Tổng biên tập Tạp chí Quốc tế về Nha khoa Thẩm mỹ (IJED) – Nhà xuất bản Quintessence.
- Thành viên chủ chốt trong Hội đồng Khoa học và Ủy ban Văn hóa thuộc Hiệp hội Nha chu Ý (SIdP).
- Chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nha chu và Phẫu thuật nha khoa.

DR. MARTINA STEFANINI

ABSTRACT

Các phương pháp phẫu thuật tạo hình mô mềm nhằm tăng chiều rộng niêm mạc sừng hóa và/hoặc độ dày mô mềm quanh implant có thể được thực hiện ở ba thời điểm khác nhau: trước khi đặt implant, đồng thời khi đặt implant, và sau khi đặt implant.

Sau khi cấy ghép implant, đặc biệt ở hàm dưới, thường gặp các tình huống lâm sàng khi hoàn toàn không còn hoặc rất ít mô mềm sừng hóa, nhiều trường hợp đi kèm với ngách hành lang nông và vị trí bám cơ cao về phía thân răng.

Trong những trường hợp này, khi không có yêu cầu thẩm mỹ, mục tiêu chính là:

- Tái tạo/gia tăng niêm mạc sừng hóa
- Làm sâu ngách hành lang nhằm giúp bệnh nhân dễ vệ sinh răng miệng.
- Giảm nguy cơ khuyết hổng mô mềm.

Kỹ thuật phẫu thuật phù hợp nhất để đạt được mục tiêu này là **ghép nướu tự do**.

Khuyết hổng mô mềm mặt ngoài của mào trên implant chủ yếu là vấn đề về độ dày hơn là chiều rộng. Việc mô mềm mặt ngoài thiếu độ dày phù hợp có thể dẫn đến dạng thoát (emergence profile) của mào không chuẩn, gây khó khăn trong việc duy trì vệ sinh.

Trong những trường hợp này, mục tiêu chính của phẫu thuật tạo hình không phải là tăng chiều rộng mô mềm sừng hóa mà là tăng độ dày mô liên kết tại vùng xuyên niêm mạc quanh implant.

Điều này được thực hiện bằng kỹ thuật phẫu thuật sử dụng **ghép mô liên kết kết hợp với vật di chuyển về phía thân răng**.

MỤC TIÊU WORKSHOP

1. Mô tả từng bước quy trình ghép nướu tự do nhằm tăng chiều rộng niêm mạc sừng hóa trước hoặc sau khi đặt implant.
2. Mô tả quy trình phẫu thuật kết hợp đặt implant xuyên niêm mạc đồng thời ghép mô liên kết dưới đường viền nướu hoặc sử dụng khuôn collagen.
3. Mô tả từng bước kỹ thuật lấy mô ghép.



Đăng ký tham gia

